



# Clamidia

## ¿Qué es la clamidia?

La clamidia es una infección de transmisión sexual (ETS) causada por una bacteria (germen). Es la ITS más común en los Estados Unidos.

## ¿Cómo puede una persona contraer la clamidia?

La clamidia se transmite cuando una persona tiene sexo vaginal, anal u oral con alguien que está infectado. La clamidia también puede transmitirse de madre a hijo durante el parto. Que se transmite a través de las secreciones vaginales y semen.

Usted puede aumentar su riesgo de infección por:

Tener relaciones sexuales sin usar un condón de látex o de poliuretano

Tener múltiples parejas sexuales

Tener una ITS o el VIH diferentes

Tener relaciones sexuales mientras drogado o bajo la influencia de alcohol puede aumentar su riesgo ya que esto hace que sea menos probable que los condones se utilicen correctamente

## ¿Quién puede contraer la clamidia?

Cualquier persona sexualmente activa puede contraer clamidia. Tener relaciones sexuales sin protección (sexo sin condón) incrementa la probabilidad de contraer clamidia. En Boston, las mujeres menores de 24 años de edad tienen las tasas más altas de la clamidia.

## ¿Cuáles son los síntomas de la clamidia?

La mayoría de personas no tienen síntomas. Los síntomas pueden comenzar alrededor de 1-3 semanas después de infectarse. Para aquellos que sí tienen síntomas, los más comunes son:

### **Para las mujeres:**

Flujo anormal (líquido amarillento o blanco) de la vagina

Dolor y / o ardor cuando orina o durante el sexo

Dolor en el estómago o la espalda

Hemorragia incluso cuando no es su período de

En las infecciones más graves fiebre,

### **Para los hombres:**

Flujo anormal (líquido espeso de color blanco o acuoso) que proviene del pene

Dolor y / o ardor cuando orina

**Los síntomas menos comunes incluyen:**

Sensación de pesadez y / o dolor en los testículos

Dolor, hinchazón o enrojecimiento alrededor del escroto

Los síntomas de sexo anal puede causar dolor, secreción o sangrado por el recto (trasero). Los síntomas del sexo oral son muy raras pero pueden resultar en un dolor de garganta.

**¿Cuánto tiempo puede una persona infectada propagar la clamidia?**

Una persona puede transmitir la clamidia a los demás desde el momento en que se infecta (por tener relaciones sexuales sin protección con una pareja infectada) hasta que se tratan. Una persona puede transmitir la clamidia a otros, incluso si no tienen síntomas. Si usted está tomando medicamentos, no tener relaciones sexuales por 7 días después de su tratamiento. Es importante saber que usted puede infectarse con clamidia muchas veces.

**¿Cómo puedo saber si tengo clamidia?**

La única manera de saber con seguridad si usted tiene clamidia es a hacerse la prueba. Un profesional médico puede pedir una muestra de orina (pipí) de la muestra o puede limpiar la zona afectada con un hisopo para la prueba de la clamidia.

*Para más Información, póngase en contacto con  
Comisión de Salud Pública  
Bureau de Enfermedades Infecciosas  
(617)534-5611 o [www.bphc.org](http://www.bphc.org)*