



**PUBLIC HEALTH FACT SHEET**  
Boston Public Health Commission  
Communicable Disease Control Division  
1010 Massachusetts Avenue  
Boston, MA 02118  
Phone: 617-534-5611 Fax: 617-534-5905

# La Gonorrea

## ¿Qué es la gonorrea?

La gonorrea es una infección de transmisión sexual (ETS) causada por una bacteria (germen).

## ¿Cómo puede una persona contraer la gonorrea?

La gonorrea se transmite cuando una persona tiene sexo vaginal, anal u oral con alguien que está infectado. La gonorrea también puede transmitirse de madre a hijo durante el parto. Que se transmite a través de las secreciones vaginales y semen.

Usted puede aumentar su riesgo de infección por:

Tener relaciones sexuales sin usar un condón de látex o de poliuretano

### **Usted puede aumentar su riesgo de infección por:**

Tener múltiples parejas sexuales

Tener una ITS o el VIH diferentes

Tener relaciones sexuales mientras drogado o bajo la influencia de alcohol puede aumentar su riesgo ya que esto hace que sea menos probable que los condones se utilicen correctamente

## ¿Quién puede contraer la gonorrea?

Cualquier persona sexualmente activa puede contraer gonorrea. Tener relaciones sexuales sin protección (sexo sin condón) incrementa la probabilidad de contraer la gonorrea. En Boston, las mujeres menores de 24 años de edad tienen las tasas más altas de gonorrea.

## ¿Cuáles son los síntomas de la gonorrea?

Muchas personas no tienen síntomas. Los síntomas generalmente comienzan de 2 días después de infectarse, pero puede tomar más tiempo.

**Para aquellos que sí tienen síntomas, los más comunes son:**

**Para las mujeres:**

Secreción anormal o aumento (líquido amarillento o blanco) de la vagina  
Dolor y / o ardor cuando orina o durante el sexo  
Dolor en el estómago o la espalda  
Hemorragia incluso cuando no es su período de  
En las infecciones más graves fiebre,

**Para los hombres:**

Flujo anormal (líquido espeso de color blanco o acuoso) que proviene del pene  
Dolor y / o ardor cuando orina o urgencia de orinar mucho  
Los síntomas menos comunes incluyen:  
Sensación de pesadez y / o dolor en los testículos

Los síntomas de la infección anal puede causar dolor, picazón, secreción o sangrado por el recto (trasero) y dolor al defecar. Una infección bucal puede causar dolor de garganta.

**¿Cuánto tiempo puede una persona infectada propagar la gonorrea?**

Una persona puede transmitir la gonorrea a los demás desde el momento en que se infecta (por tener relaciones sexuales sin protección con una pareja infectada) hasta que se tratan. Una persona puede transmitir la gonorrea a otros, incluso si no tienen síntomas. Si usted está tomando medicamentos, no tener relaciones sexuales por 7 días después de su tratamiento. Es importante saber que usted puede infectarse con gonorrea muchas veces.

**¿Cómo puedo saber si tengo gonorrea?**

La única manera de saber con seguridad si una persona tiene gonorrea es haciéndose la prueba. Un profesional médico puede pedir una muestra de orina (pipí) de la muestra o puede limpiar la zona afectada con un hisopo para la prueba de la gonorrea. Muchas personas con gonorrea también tienen clamidia y deben ser examinados y tratados por ambos.

***Para más información, póngase en contacto con  
Boston Comisión de Salud Pública  
Oficina de Enfermedades Infecciosas  
(617)534-5611 o [www.bphc.org](http://www.bphc.org)***