

**O que é sífilis?**

Sífilis é uma Infeção Sexualmente Transmissível (IST) causada por uma bactéria (germe).

**Como uma pessoa pode pegar sífilis?**

A sífilis é transmitida de pessoa a pessoa através do contato de pele a pele com uma ferida da sífilis. As lesões podem estar presentes na vagina, pênis, ânus, boca, lábios e reto. Uma infecção ocorre durante o sexo vaginal, anal ou oral. A sífilis pode ser transmitida mesmo que as lesões não possam ser vistas ou sentidas, e por esse motivo as pessoas podem transmitir a sífilis sem saber que estão infectadas. A sífilis também pode ser transmitida pela mãe ao feto durante o parto.

**Você pode aumentar o risco de pegar a infecção se:**

- Não usar uma camisinha de látex ou de poliuretano durante o sexo
- Tiver vários parceiros sexuais
- Tiver uma outra IST ou HIV
- Tiver relação sexual enquanto estiver sob o efeito de drogas ou de álcool. Isso aumenta o risco pois é menos provável que a camisinha seja usada corretamente

**Quem pode pegar sífilis?**

Qualquer pessoa sexualmente ativa pode pegar sífilis. Ter relação sexual sem proteção (sexo sem camisinha) aumenta a chance de pegar sífilis. Enquanto homens e mulheres têm risco de pegar a infecção, mais da metade dos casos reportados nos EUA são de homens que fazem sexo com homens (HSH).

**Quais são os sintomas da sífilis?**

Muitas pessoas não têm sintomas. Os sintomas podem começar 10 a 90 dias depois da infecção, mas a média é de 21 dias. Algumas pessoas podem não ter nenhum sintoma durante anos.

**Quais são os sintomas da sífilis?**

Muitas pessoas não têm sintomas. Os sintomas podem começar 10 a 90 dias depois da infecção, mas a média é de 21 dias. Algumas pessoas podem não ter nenhum sintoma durante anos.

Para quem sente os sintomas, os mais comuns são:

- Lesões ou caroços na boca, ânus, vagina, pênis ou testículos (saco)
- Uma erupção no corpo inteiro, incluindo as mãos e os pés
- Perda de cabelo
- Febre
- Gânglios inchados

Se não for tratada, a infecção pode durar vários anos.

**Durante quanto tempo uma pessoa infectada pode transmitir a sífilis?**

Uma pessoa com uma lesão ou caroço pode transmitir a sífilis a partir do momento em que foi infectada até ser tratada. Como as lesões podem não ser visíveis, as pessoas podem transmitir a infecção a outras sem saber. Tendo feito tratamento, você pode transmitir o germe até que as feridas estejam totalmente cicatrizadas. Quanto mais tempo a pessoa infectada ficar sem tratamento, maior será o risco de complicações.

### **Como posso saber se estou com sífilis?**

A única forma de ter certeza se está com sífilis é **fazer o teste**. O profissional de saúde geralmente faz o teste de sífilis com uma amostra do sangue colhido. Como a sífilis não tratada pode causar problemas para o feto, toda mulher grávida deve fazer o teste de sífilis. As pessoas cujas atividades sexuais representem um risco de contração da sífilis devem ser testadas regularmente para que recebam tratamento imediato se estiverem infectadas.

### **Onde posso fazer o teste?**

A maioria dos profissionais de saúde pode fazer os testes de sífilis e outras ISTs. Para localizar um centro de saúde perto de você, ligue para a linha de saúde da prefeitura (Mayor's Health Line) pelo **617-534-5050 e ligação gratuita: 1-800-847-0710** ou visite <http://www.hivtest.org/STDTesting.aspx> e digite seu código postal (ZIP).

### **A sífilis pode ser tratada?**

Sim, a sífilis geralmente é tratada com injeções de antibióticos.

### **Meu parceiro deve fazer o tratamento?**

Sim. Você pode contrair a sífilis novamente mesmo tendo sido tratado. Por isso é importante que todos os parceiros de sexo recentes ou frequentes sejam tratados ao mesmo tempo, para que você não seja infectado novamente.

### **O que acontece se a sífilis não for tratada?**

Se ficar sem tratamento, a sífilis pode causar problemas de saúde muito graves. A infecção de longo prazo, sem tratamento, pode causar danos aos órgãos internos. Além disso, as pessoas com sífilis têm até 5 vezes mais probabilidade de contrair o HIV, se expostas.

### **A sífilis pode afetar a mulher grávida e o feto?**

Sim. A sífilis pode causar problemas sérios na mulher grávida e no feto.

### **Como você pode se proteger para não pegar a sífilis?**

A única forma 100% eficiente da prevenção da sífilis é não ter relações sexuais.

Se tiver relações sexuais, pode limitar seu risco tomando as seguintes precauções:

- Use sempre uma camisinha ou barreira oral de látex ou de poliuretano quando fizer sexo anal, vaginal e/ou oral
  - As camisinhas feitas de materiais “naturais” podem proteger contra gravidez, mas **NÃO** de ISTs
- Reduza o número de parceiros se optar por ter relações sexuais
- Converse com seu parceiro sobre a situação de IST e sobre fazer o teste
- Converse com o profissional de saúde sobre sexo seguro e sobre fazer o teste
- Entenda que ter relação sexual quando estiver sob a influência de drogas e/ou álcool pode tornar mais provável o sexo sem proteção
- Entre em contato com o seu médico se tiver qualquer um dos sintomas



**Para mais informações contate  
Boston Public Health Commission  
Infectious Disease Bureau  
617-534-5611 ou [www.bphc.org](http://www.bphc.org)**