



蝙蝠和狂犬病

什么是狂犬病？

狂犬病是由一种病毒所引起的疾病，它会影响到大脑和脊髓。患有狂犬病的动物的唾液中存在这种病毒，它可以通过咬伤或抓伤的伤口传染给人。狂犬病不能治愈，但它是可以预防的。

关于蝙蝠和狂犬病，我需要了解什么？

在美国，人类狂犬病多数是由于蝙蝠咬伤所引起的，而被咬伤者没有意识到被咬或未将被咬的情况进行报告。蝙蝠的很小的牙痕是很难看到的，所以即使人被咬伤也可能没有注意到。健康的蝙蝠通常会躲避人，但患有狂犬病的蝙蝠可能会掉在地上，人们会触摸它。如果有任何人可能触及了一只蝙蝠，这只蝙蝠就应该被捕获并对其进行狂犬病测试。除了触摸蝙蝠，如果在一个房间里发现一只蝙蝠而这个房间里无人看管的孩子，或起床时在房间里看到蝙蝠，就会被认为人有被蝙蝠咬过的风险。超过人的头部的高度飞行的蝙蝠、还没有与人或动物接触过的蝙蝠，并不构成风险。

捕捉蝙蝠并对其进行狂犬病测试：

捕捉蝙蝠并对其进行狂犬病测试：

在实验室中对蝙蝠进行测试，确定它是否有狂犬病，由此可以判断一个人是否需要接受目的是预防狂犬病的治疗。在波士顿，如果有人或宠物接触到蝙蝠，并且你知道蝙蝠在哪里，可以请波士顿动物控制中心 (Boston Animal Control) 协助捕捉蝙蝠，该中心的电话是 (617) 635-5348。

按照下列步骤来捕捉蝙蝠：

- 蝙蝠可以咬穿织物，所以要使用一个有盖的坚固的容器来装蝙蝠。
- **切勿用裸手处理蝙蝠。**要戴上厚厚的皮手套。
- 等到蝙蝠已经落到地上。慢慢接近蝙蝠，将容器罩在蝙蝠上面。然后将容器的盖子或一块纸板滑入容器下面并将容器翻过来，蝙蝠就会被捕捉到容器里。用胶带将盖子粘牢。
- 将蝙蝠提交给 Hinton State Laboratory Institute 进行狂犬病检测，该机构的电话是 617-983-6385。

如果我或我的宠物被蝙蝠或其他动物咬伤，我应该怎么做？

蝙蝠和其他野生动物如臭鼬、浣熊、狐狸和郊狼都可能携带狂犬病。其他动物如猫、狗、雪貂、马、牛、山羊和骆驼等，如果没有接种恰当的疫苗，也可能患狂犬病，通常是由野生动物咬伤所致。

如果被蝙蝠或其他动物咬伤，要采取下列步骤：

- 立即用肥皂水彻底清洗被咬部位。
- 去看医生，看看你是否需要接受狂犬病治疗。伤口也可能会导致其他感染(如破伤风)，需要就医。
- 应检测咬伤人的野生动物是否患有狂犬病。可以请波士顿动物控制中心 (Boston Animal Control) 协助捕捉蝙蝠，电话是 (617) 635-5348。
- 如果你被别人的宠物咬伤，要记住宠物主人的姓名、地址和电话号码。联系波士顿动物控制中心 (Boston Animal Control) 请求协助，电话是 (617) 635-5348。
- 在大多数情况下，狗、猫或鼬应关起来观察10天。如果它们在这10天期间生病，应立即咨询兽医。
- 如果你认为你的宠物已被蝙蝠咬伤，立即联系兽医请求协助。如果可能，应测试蝙蝠是否患有狂犬病。记住为猫、狗和其他动物进行预防接种并及时补种。

怎样才能防止狂犬病？

- 为宠物接种疫苗能防止狂犬病在野生动物和人之间的传播。
为您的宠物（狗、猫、雪貂）接种预防狂犬病的疫苗并及时补种。
- 教导孩子不要跟任何不熟悉的动物玩耍，如果被咬伤要告诉大人。
- 切勿让婴儿或幼儿单独与任何动物相处。
- 如果您见到表现出不寻常的行为的流浪狗、猫或其他动物，要向波士顿动物控制中心报告，电话是（617）635-5348。
- 不要吸引动物到您家或院子里，垃圾桶要盖紧，在你的家中采取防蝙蝠措施。
- 不要喂食、接近、触摸或收养野生动物。不要把野生动物当作宠物。
- 猎人和捕手应避免捕猎有异常行为的动物，也不能捡拾死动物。
处理猎杀的动物时要戴手套，要彻底煮熟所有肉类再食用。
- 与市民接触的动物园内的动物，都应接种疫苗。
- 旅行时，尤其是在美国以外旅行，应避免与狗和猫接触，即使它们表现得很友好。

什么是狂犬病暴露后治疗(或称PEP)？

如果一个人接触到蝙蝠，并且未能为蝙蝠进行化验，通常建议这个人接受狂犬病的预防性治疗。如果捕捉到了咬人的蝙蝠并已为其进行测试，这种治疗通常是可避免的。狂犬病暴露后的预防性治疗的方法是打一针狂犬病免疫球蛋白（HRIG）和四针狂犬病疫苗，通常是注射在手臂。

如何让我的房子能够防止蝙蝠进入？

有些蝙蝠生活在建筑物里，如果它们与人接触的机会不大，可能没有必要除掉他们。然而，总是应该把蝙蝠阻隔在你家的房间之外。要在防止蝙蝠进入你的住宅方面得到协助，请与一个野生动物保护机构或病虫害防治机构取得联系。

如果您希望防止蝙蝠进入你的住宅，请遵循以下建议：

- 检查你的住宅，看看是否存在能让蝙蝠进入的洞。
- 使用纱窗、烟囱帽，在通往阁楼的门的下面放置挡风板。
- 用不锈钢丝网或缝隙填塞物填充电气和下管道孔。
- 确保所有对外门都紧紧地关闭。
- 观察蝙蝠在黄昏时从哪里飞出去，在这些地方松散地悬挂透明塑料布或鸟网（让蝙蝠能够飞出去，但不能重新进入）。
- 在蝙蝠已被放出去以后，可以将开口永久性密封。
- 从五月到八月要避免清除蝙蝠，因为在此阶段许多年幼的蝙蝠还无法飞行，并可能被困在房里并死亡，或进入人的居室。如果你在这几个月遇到问题，请联系持有马萨诸塞州的消除野生动物许可证的“滋扰性野生生物控制机构”。问题动物控制（PAC）机构的列表可在这个网上找到：http://www.mass.gov/dfwele/dfw/wildlife/pac/pac_agents_nd.htm
- 在秋天或冬天大多数蝙蝠都会去冬眠，所以这是阻隔蝙蝠的最好时机。

